

ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT

haluavat osallistua aktiivisesti omaan hoitoonsa

Merkittävä osa pohjoismaisista eturauhassyöpäpotilaista saa syöpädiagnoosin käytyään alunperin lääkärissä muista syistä. Valtaosa vastaajista haluaa keskustella lääkärin kanssa hoidoista ja tehdä päätöksen yhdessä, ilmenee tähän asti laajimmasta pohjoismaisesta eturauhassyöpäpotilaiden kyselytutkimuksesta.¹



DIAGNOOSI

Suuri osa suomalaispotilaista saa eturauhassyöpädiagnoosin käytyään lääkärissä muusta syystä.

57 %

saa diagnoosin käytyään alunperin lääkärissä jostain muusta syystä.

49 %

oli hakeutunut lääkäriin oireidensa vuoksi.

43 %

ei tiedä, että alttius sairastua eturauhassyöpään saattaa olla perinnöllinen.

HOITO

Suomalaispotilaat kokevat saavansa hyvin tietoa sairaudestaan.

72 %

sai diagnoosin yhteydessä tyhjentävän selityksen sairaudesta ja sen hoidosta lääkäriltä/hoitohenkilöstöltä.

Hoidoilla on myös haittoja.

78 %

on kokenut erektiovaikeuksia hoidon seurauksena.

62 %

haluaisi tietää enemmän sairaudestaan.

33 %


on kärsinyt inkontinenssista ja 25 prosenttia kuumista aalloista.

24 %

vastaajista on kokenut väsymystä.

ELÄMÄ ETURAUHAS- SYÖVÄN KANSSA

Suuri osa suomalaispotilaista suhtautuu elämään positiivisesti.
Perhe ja toiset eturauhassyöpöpotilaat ovat tärkeä tuki.



87 % vastaajista kokee olevansa valmis elämään eturauhassyövän kanssa koko loppuelämänsä.

87 % sanoo puhuvansa lääkärin ohella sairaudestaan eniten kumppaninsa/puolisonsa kanssa.

54 % puhuu eniten ystäviensä kanssa.

50 % puhuu eniten toisten eturauhassyöpöä sairastavien kanssa.

15 % eniten Eturauhassyöpäyhdistyksen (PROPO) kanssa.

SEKSIELÄMÄ

Eturauhassyövän hoidolla on suuri vaikutus suomalaispotilaiden seksielämään.

*kaikki Pohjoismaat

86 %

kertoi erektiovaikeuksista vs. **87%***

80 %


on kokenut yhdyntävaikeuksia vs. **79%***

75 %:lla

on vaikeuksia saada orgasmi vs. **71%***

37 %

vastaajista ei enää ollut seksuaalisesti aktiivisia aloitettuaan eturauhassyövän hoidon vs. **31%***



MISTÄ SAAT TIETOA?

73 %

suomalaisista vastaajista saa tietoa eturauhassyövästä Suomen eturauhassyöpäyhdistyksestä.



60 % saa tietoa hoitavalta lääkäriltä

55 % urologilta

40 % internetistä

37 % toisilta potilailta

23 % esitteistä

17 % sairaalalääkäriltä

Lähteet:

1Pohjoismainen eturauhassyöpöpotilastutkimus

Potilaskyselytutkimukseen vastasi yhteensä lähes 7000 eturauhassyöpöpotilasta Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa 2013–2014. Vastaajat löytyivät potilasjärjestöjen kautta muun muassa verkkobannereilla ja kutsukirjeillä, paperikyselyillä sairaaloissa ja lääkäriasemilla sekä mainoksilla. Vastaajat olivat saaneet eturauhassyöpädiagnoosin keskimäärin 5,9 vuotta aiemmin. Potilaskyselyyn toteuttamiseen osallistuivat Suomen (PROPO), Ruotsin (Prostatacancerförbundet), Tanskan (PROPA) ja Norjan (PROFO) sekä johtavia eturauhassyöpöasiantuntijoita. Tutkimusta rahoitti Astellas Pharma Nordic.

ETURAUHASSYÖPÄ ON MIESTEN YLEISIN SYÖPÄ SUOMESSA²

Vuosittain uusia eturauhassyöpätapauksia todetaan yli neljä tuhatta.

4602

uutta eturauhassyöpä-
tapauksia (2012).³

43267

eturauhassyöpäpotilasta
oli elossa 1.1.2013.³

855

miestä kuoli tautiin
vuonna 2012.³

Vuosina **2007–2009**

diagnosoitujen suhteellinen elossaolo
luku oli yhden vuoden kohdalla **98 %**
ja 5 vuoden kohdalla **93 %**.³

Sairastuneiden keski-ikä on **70 vuotta**.²

ETURAUHASSYÖVÄN SYYTÄ EI TUNNETA.²

Riskitekijöitä ovat ikä, etninen tausta ja
ympäristötekijät ja perimä.²



2–5 %

liittyy periytyvään
syöpäalttiuteen.

15–20 %

esiintyy perheittäin.

TUNNISTATKO OIREET?

Varhaisvaiheessa eturauhassyöpä voi
aiheuttaa virtsaamisoireita, joita esiintyy
myös hyvänlaatuisissa eturauhas- ja
virtsarakkosairauksissa.^{2,4}

Pitkälle edenneessä eturauhassyövässä
etäpesäkkeet aiheuttavat luustokipua tai
-murtumia.²

ESIINTYVYYS


187 180

eturauhassyöpäpotilasta oli
elossa Tanskassa, Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa (2011).³

ILMAANTUVUUS

22 725 uutta

eturauhassyöpätapausta
löytyi vuosittain neljässä
Pohjoismaassa (2005–2011).³



KUOLLEISUUS

5461 miestä on kuollut
eturauhassyöpään neljässä
Pohjoismaassa (2005–2011).³

MITEN TODETAN?

Syöpädiagnosi tehdään eturauhasesta
otettujen koepalojen tutkimuksella.²

Lisäksi tunnustellaan eturauhanen ja
määritetään seerumin PSA-pitoisuus.²

Eturauhassyövän ennuste on parantunut
viimeisten 15 vuoden aikana.²

Lähteet: 2) Eturauhassyövän Käypä hoito -suositus 27.5.2014. 3) Suomen Syöpärekisteri 2014. <http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/ajantasaiset-perustaulukot/koko-maa/>. 4) <http://www.propo.fi>